

PDF p.513 · left leaf

· 82% agree

新板增補天下便用文林妙錦萬寶｜寶全書卷之二土｜一七

〇保賜冬｜嬰秘訣

一小兒初生宜先濃煎甘豆｜前宜草黃連湯急用軟細｜絹或絲綿包指蘸｜損醮藥輒｜搗出口中惡血｜面倘或不及即以藥湯灌之待吐出惡沫方與乳吃令出痘亦稀少

一初生二三月宜細｜綱縛令臥｜臥勿竪頭｜一抱出免致驚癇/一｜過初生四五月止與乳吃六月以後方｜僊乃與稀湯｜粥哺之周歲以前切不可｜一吃當｜蜃腥并｜井生冷之物令兒多疾二｜一三歲後職｜臟腑稍壯終｜絕與童｜軍腥二小｜一平兒神色總論

凡小兒頑｜元鬼病宜先觀形症神色然後一｜門嬰全

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.514 · right leaf

upper register · 90% agree

察｜寒脉假如肝之為病則面青心之為
病則面赤脾之為病則面面｜—黄肺之為
病則面白賢乏｜腎之爲病則面黑先要辨
別｜別五臟形症次看稟收｜稟收盈虧胎氣虚
實明其標本而治之無不可者
○入門審候歌
觀形察色辨因由陰弱陽強髮｜髮硬朶｜—
若是傷寒雙足冷要知有熱肚皮求｜—
鼻冷便知是瘡｜痞疹耳冷應知風熱症｜—
渾身皆熱是傷寒上熱下冷｜冷傷食病｜—
五指稍頭冷｜冷驚来｜來不可當
若途中指熱必定是傷寒
中指獨自冷｜冷麻症｜痘症相傳
女右男分左分明仔細看
○觀百｜面部五色
面｜向赤為風熱面青驚可詳

lower register · 92% agree

○祈嬰女｜—要覧附滋神｜補諸方｜芳
○直訾｜指真浪｜源論
結胎者男女精血也男属陽而象乾乾道資始
女属陰而象坤坤道資生陽主動故能施與陰
主静故能承受夫動静相忝｜來陰陽相會必有其
時乃成胎孕凡經盡一日至三日新血未盛精
勝其血血開裹｜裏精精入為骨男胎成矣四日至
六日新血漸長血勝其精精開裹｜裏血血入居本
女胎成矣六日至十日鮮血成者縱成亦皆女
胎欲求子者全在經盡三日以裏｜衷交合如俛首
拾芥萬舉萬當斯時男女母慕愍｜寡怒母醉飽母食
多｜炙博辛熱母用他術質｜贊益陰陽和平精血調陽｜暢
交而必孕｜至孕而丕｜—必育育｜食而為子堅壯｜化且壽至真

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.514 · left leaf

upper register · 75% agree

心肝形此見脉證辨温凉
脾怯黄疳｜疰積虚寒疘｜呪白光
若逄｜逢生黑氣腎敗命須亡
○面圖｜部觀形察色圖
下額属腎水/肝左腮属肝木/右腮属肺金｜—
小兒三歲以下有病須看虎口三関
第一節名風関第二節名氣関第三
節名命関辨其紋色紫者属熱紅者
属寒青者驚風白者瘖｜疳病黒者中恵/著｜悪黄者脾之邪也若兌｜困苦兒於
風関爲輕氣
—｜與氣於風則身命関｜—則難治矣—｜下頦属腎水左腮属肝木額上属心
火鼻準属脾土右腮属肺金

lower register · 96% agree

切要在此数語受娠之後宜令鎮靜血氣安和
則胎孕長養又須内遠七情外薄五味大冷大
熱之物皆在所禁苟無胎痛胎動漏血瀉痢及
風寒外邪不可輕湯服藥亦不得交合陰陽觸
動慾火未産則胎動不常既産則胎毒不已降
生之後播｜攝養一知胎前盖母食熱則乳熱母食
寒則乳寒母食膏梁煖烈｜瀝凝刻之物則乳毒有是數｜数
者子受其害矣求嗣之道誠不出此也
○種子歌訣
三十時辰兩日半二十八九君須箄落紅将盡
是佳期經水過時徒霍亂霍亂之時柱用功樹
頭樹底覓残｜殘紅鮮得花開能結子何愁丹｜卅桂不
成叢○鮮旦｜旦一日十二時兩日半總三十時辰
盖｜益婦人月信来止是有兩日半假如初｜初一日子

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.515 · right leaf


upper register · 73% agree

虎口三関節 | 指掌圖訣
○二節卯位氣闕○三節辰位命閎 | —
男左女右觀之○三 | —節寅位風閎/命像風/○虎口三 | —関節掌圖訣 | —
○二節卯位氣闕 | 関○三節辰位命閎 | 関虎口有三関風氣命相叅青紅
驚急病黄黑水相殘紫色生驚
搖 | 搖紅青熱 | 煞在肝関中存五色
二 | 節節見絞 | 絃班未見三関節相逢
搖紅青熱在肝 | 可賀安過了三関中存五色 | 節神仙不可攀
○小兒至三歲以上乃用一指
按十 | 接寸関尺三部常以六七至為率添
則為熱減則為寒浮 | 淳洪風盛救 | 數則多
驚沉遲為虛沉實為積
○家傳治小兒急慢驚風

lower register · 96% agree

時月信来数至初 | 初三日巳時是也當此筭之落
紅将盡乃是月信行至二十八九時也佳期指
陰陽交姤也盖此時子宮開而納精也金水即
月信若過此時子宮巳閉而不納精矣若經水
有過不及者是血脉不調宜服後各藥餌也
○結胎歌訣
洞裏桃源何處尋都来一寸二分深交歡之際
君須記過却區區枉費心○鮮旦 | ○靜曰洞裏者陰户
也桃源者子宮也在陰内一寸二分深泄精之
時不可深入深入則泄精他處 | 處胎不結而子難
成是區區無益也若値桃源定生男産女
○虛實歌訣 | —
他虛我實效乾坤以實投虛是的真 | 直總是兩家
皆寡慾佳期相値始相親○鮮旦 | 曰男寡慾則實

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.515 · left leaf


upper register · 80% agree

—｜七膏頭瀉濕九｜每籤齒丸天花粉乙両｜面五錢天淋/入｜麻八錢活
石飛白附子各乙両青｜責家
石煆｜服紫英石煆軟白｜服畝石羔煆｜服寒水石
姜蚕｜蠶微砂｜炒去觜生｜藿生膽南星各五錢
全蝎｜鷄十个去｜大足竺竹黄乙錢牛黄
四分真｜直珠制麝｜露香各五分另研金
箔銀箔各五十片硃砂五錢為衣｜末
○右用甘草｜豆五錢煎湯和麵糊為丸
梧桐子大每服一丸或二丸灯｜剉心
薄荷煎湯有瀉加車前子調下
○秘傳小児｜兒症痘症｜—治—｜訣大凡觀痘須要識生死辨虛實知訣
法乃世之良醫君｜若不能知此訣法未
免用薬失宜痘疔｜癍死証者友｜反用薬調
理須危而有生意者友｜反棄而不治其
心悟｜—人命者多矣其証雖｜雖云多端

lower register · 89% agree

夕寡｜金湯之七女眞慾則虛又値落紅將盡佳｜住期調寒鼓瑟｜故棲候
彼先施陰而交合則胎成矣○—｜〇或陰弱不能攝｜摑
陽或陽微不能射陰父｜交而不孕則當與治｜温陽調陰夫
男女精血既口｜充別無他証惟守虛之法是為知要
○—｜〇弱陰不能攝陽圖說
弱陰不能攝陽謂女人陰血衰弱雖投真陽理
盛之精不能攝人｜入子宮是以父｜交而不孕孕而不
育或因病後産後經後将理矢｜失宜労動過節虧
損陰血所致治宜調經養血
女/治｜—

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.516 · right leaf


upper register · 89% agree

然盃其｜峯貴要亦个｜不外乎寒热｜熱虛實四者
而已矣以属虛而寒者大抵宜用温
補之藥实而热者宜用清凅｜泉解毒之
剤抑其太過引其不及屑｜歸之於中道
而已誠能如是乃為當世之良医
○看耳脉法歌訣
兩｜两耳紅｜红筋痘｜短必輕紫筋起耳重沉
沉徃徃用藥相攻觧十个难求
三五生○九｜儿用蕈改｜藥攻觧臟腑毒氣男｜勇
左女右耳仔細分明看水紅
桃紅火紅紫紅筋
○發热三朝决生死門
一發热｜熱時用紅紙｜紙條蘸｜爛麻油點心頭
皮肉理若有一塊紅者或遍身有成
塊紅者八丸目｜九日後决死勿炒｜治
一發热｜熱時一日遍身即生紅點稠密｜氣

lower register · 96% agree

四物湯治陰弱月水不調前後愆期常服調
益荣｜宗衛滋養血氣及胎前不安産｜塵後血塊不散
或亡血過多或惡露不下腹痛等症並効
當歸川芎白芍藥熟地黃
○右用水一盞半煎空心温服
如經候先期者血熱加黃連○過期者血虛加
參芪｜民白朮○過期而色淡者痰多用芳歸二味
合二｜三陳湯服○過期紫黑有塊者血熱也必作
痛加香附黃連○經水紫色成塊者熱也加黃
連柴胡○肥人不及日数｜數而多血有熱加香附
子南星半夏黃連白朮○瘦人血枯經閉者加
桃仁紅花或服越鞠丸｜九○氣充｜充經脉故月事煩｜頓
併臍下多痛加芍藥○經欲行臍須絞痛加玄

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.516 · left leaf

upper register · 91% agree

如垂孫｜忝種樣模過不碍手者決死勿治
一發時腹中火痛腰如被杖及至報
痘｜疽乾燥而前痘痛猶不出者決死物｜泐
一發時持身無大熱腰痛腹不痛過
三日｜月後欲｜絲生紅點堅硬碍手者勿藥｜染
有生所謂吉已證｜一
一發熱｜執時腫｜渾身温煖不時發驚着痘｜者瘡
在心經而出也乃為吉兆可治而愈
一發熱之時頭面上有一片紅其色
如胭脂者六日巳｜已後決死勿治
〇報痘三朝決生死門
一報痘之時頭面希少胸前背上皆
無根實紅潤頂实｜突碍手有如水珠兆｜光
澤者上吉｜去也不須下藥｜葯而愈
一報痘之時腰腹疼痛不止口氣大
臭其痘出紫黑｜重色黜者決死勿治

lower register · 89% agree

胡侯榔｜祇樵苦練木香〇一｜〇經水過多加黄芩白术〇
一｜〇經水澁少加葵花紅花〇一｜〇經水滴｜適果適断或有
徃来寒熱宜先服小柴胡湯去寒熱｜執後以四物
湯和之〇一｜〇經候不通腹腰或痛本方對調胃承
氣湯｜筋服皂｜呈燭散〇一｜〇經候不調心腹疼痛只用芒｜苦
歸二味名芎歸湯又名君臣散或產後去血過
多煮｜軍煩一切去血並用〇一｜〇經事｜車不行腹中結塊
加桂心遂｜蓬术名六合湯〇一｜〇經候将来作疼血實
氣澁｜濾加醋炒義木玄胡索木香挾熱加黄連柴
胡或加桃仁紅花香附〇一｜〇經行不止加阿膠地
倫｜檢荆芥穗〇一｜〇經行後作疼氣血俱虚宜服八珍
湯即因｜卹四物對
四君子湯｜〇
〇經水過多淋瀝不断及妊娠調
一｜四君子湯攝失宜胎氣不安或因損動漏｜滿血傷胎加阿膠
艾葉其｜甘草名膠艾湯〇一｜〇若見腎肝脉遂｜逆微小腹

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.517 · right leaf

upper register · 82% agree

一報痘之時白色皮薄而光根全無
紅色或根帶一點紅三五日如墨豆｜棄
樣此豆決不缺貫腹父｜久後成一胞清
水擦破即死不可因其好者妄下藥
一報痘之時口鼻及耳出紅血不止
者決死
一報痘之時全不起頂如湯泡及灯
草火燒著｜者十日｜日後決主痒塌而死不
可妄治
一報痘之時起紅班如紋者六日後
〇一｜決死一報痘之時起黑班如痣狀肌肉有成塊黑者即時而死勿可治也起脹
三朝決｜共生死門
一痘｜疱三日之後痘｜疱當逐漸起脹在紅
成塊黑著郎時而死勿可治也/紋｜綻頂紅｜絕肥病光澤者不必用藥配宣｜此言

lower register · 85% agree

四｜冷痛者属寒加炒乾姜赤白帶下脉沉微腹痛或陰中痛用本方剛加桂附子五
實咬咀
每服五錢水煎食前服名元戎｜戎六合湯
逍遥散治發熱經候不調労熱咳嗽並宜服
當歸芍楽｜藥白朮｜朮甘草赤茯苓
柴胡〇右用水一盞半煎服
〇微陽不能射陰圖說
微陽不能射陰謂男子陽精微薄雖遇女人血
海虛靜之日流而不射多不成胎蓋因平時嗜
慾不郎｜即施泄太多所致法當｜當補益精元蕪｜兼用工
夫存養無令妄動候陽精充實方授投虛之法
一舉面｜面成矣
兩尺脉大｜六或数小便常赤未交易興既交易泄
或自遺豪遺｜潰者蒙潰真不固及左尺腎脉洪大或数遺

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.517 · left leaf


upper register · 89% agree

一痘當起脹之時根窠金然不起頭
面皮肉紅腫如瓜瓤｜瓠之狀者決死物
一痘當起脹之時遍身痘頂皆黑其
有眼如卸｜釘孔紫黑者決死勿治
一痘當起脹之時遍身痘陷｜陷伏不起
者腹中膨脹不能飲食氣促神昏者
死〇一｜〇一痘當起脹之時腰腹或痛遍
身俱是紫黕如蛟虫｜虺咬全不發起者
勿治〇一｜〇一痘當起脹之時黑陷鬪乱｜陷閙亂
神氣昏曆｜情者決死勿治
〇貫瞭｜買臘三朝決生死門
一痘當起脹三日之後根窠飲食不/膿茎｜紅潤貫濃充滿如黄脯｜臘色三｜二
便如常飲食
一｜不減吉候也不必下藥
一痘當貫膿之時純是清水皮白而
溥｜薄與水｜氷泡相似三四日遍身爪破而一｜真方宅仝書

lower register · 95% agree

一｜金匱二七精尿血淋症等症並属陰虚治在補陰宜服丼
溪大補陰丸補陰丸加味虎潜｜潛丸之類〇兩尺
脉微或遲小便清陽事不舉勉力入房未覚｜寛先
痿或所泄清令微薄及右尺命門脉微細陽痿
精清｜瀝等証並属陽虚治在補陽宜服還少丼｜丹巨
勝子丸之類〇或相火妄動陽事数舉右｜石尺命
門脉洪大此為水不勝火與陰虚同治法補陰
則火自降也〇或陰陽俱虚兩尺脉微弱無力
真精清薄宜服八味丸補天丸
男一｜治

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.518 · right leaf


upper register · 86% agree

—｜死也一痘當貫膿之時痘中乾枯全无血
—｜水名空疹痘決死也｜—
一痘當貫膿之時吐痢不止或二便下血乳食不化痘爛無膿者決死
一痘當貫膿之時二便不通目閉声｜黄
唾腹中脹滿肌肉黒者決死勿治
○結厭豆朝決生死門｜—
一痘｜痂當厭豆｜之時色轉疹臓成紫蒲蜀｜蕭匍
色者一二者決從口唇四邊結膿肉｜厭內
腹中收｜收至两眼然額上和脚一齐結
膿｜厭落皮而愈此乃吉証也不必驚｜凝
下藥
一痘當厭豆｜壓之時遍身臭爛如枯｜栟拾不
可近目中無神氣者決死勿治
一痘當厭豆｜壓之時遍身發痒狐｜抓搭無膿

lower register · 88% agree

○調元
還少卅｜丹治右尺命門脉微細陽事痿弱精氣
不足陽虚之證
山藥牛膝去芦酒浸遠志
去
心
山茱萸去核巴戟去
—｜心白茯苓五味子豆鳥｜石鳥
蒲蓯容茴香｜從蓉崗查
楮實子杜仲炒去絲｜一兩熟池黄
枸杞子各一
两｜兩半
右為末煉蜜和棗泥丸如梧桐子大
每服二
五十丸｜九温酒或塩湯送下日三
服食前
巨勝子丸治右尺命門脉虚微欲脫
陽痿不
舉陽脫之證
孰也｜龍池黄四両生地黄何首烏
川牛膝酒洗
天門冬去心枸杞子豫｜從容兎｜
兔絲子楮實
巨勝｜螣子白茯苓栢子仁天雄炮
｜權地巴戟
去
心｜—酸棗仁｜食一破故盬｜帝
北五味覆盆子｜—

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.518 · left leaf

upper register · 91% agree

者皮捲如豆殼乾者決死勿治
一痘當歷口｜壓之時發寒手足亂瘡｜顫撞咬牙
噤口者郎｜即死
一痘當歷口｜壓之時目閉腹脹足冷過膝
者決死
一痘當歷口｜壓之後豆瘢雪白全無血色
過後亦死可用助氣血藥｜蒸以养脾胃
預先治之
已上二十四日生死形証之説詳矣
須是热讀｜讀玩味則臨証之時便知何
証為生何証為死何者當治何者不治治者決｜必保其生不治者決許其死
死生是｜也宅其明如此則手到即痊矣
小兒痘疹傳經論
如疹之初発者乃壬癸水也水既流出則其源必乾鮮不作渴｜渴是三者一｜真方定全書

lower register · 87% agree

乾山薬｜案續断各一/酪｜一一韭子鶏頭子川椒｜一
胡蘆巴｜膚笆蓮花叉｜蓳
各五
錢
木香二銖｜錢
五分
右為末煉蜜丸梧桐子大每服七十九｜丸甚盛
者首｜旨丸空心温酒下
大｜天補陰丸治左尺腎脉洪大或数｜數遺精永血
壯｜壯水之要薬也
黄蘗塩｜端酒
炒｜一知母各四兩
一｜制同熟地黄龟｜魚板各一兩｜一
六兩
右為末煉蜜和猪脊髓丸梧桐子大每服七
十丸空心塩白湯下
補陰丸治左尺腎脉洪大或数｜數精元不固實｜補
陰制火之薬也
黄蘗｜葉八兩｜一知母制同前熟地黄酪｜酢三陳皮鑽｜鎖陽
白芍炒川牛膝酒一｜洗當歸各一兩
五錠｜箇龜板四兩酒浸味火｜酥炙
虎脛｜脛骨一兩制同上〇右為末酒煮｜煮羊肉丸梧桐

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.519 · right leaf


upper register · 92% agree

金木土也先独発｜癸達此无所疑発好
吉兆傳於心者其瘡紅密｜密是也傳於
肝｜所者其毒少也傳於肺者其疹稀也
傳於脾者其疹踈｜昧也傳於小腸者其
疹亦少不能起発｜癸者是也傳於大腸
者其疹必大赤也此辨五臓｜臓所傳務
要随証｜证用藥热｜挽者凉之炒黄芩
防壬｜圭
荆芥連喬之類寒者温之人参白朮
茯苓甘草木香之類虚者補之四君
子湯也実者平之平胃散加鮮毒及
散血之藥凡看人之気｜气色明其五行
辨其五臓察其藥性医者再去所疑
使患者容易愈矣｜俞突
○用藥加減法
若｜疊泄者柯子倍用又加肉豆寇｜冠
若瘡
紅為之热｜熱宜炒荆｜前芥芍藥防壬
｜圭之類

lower register · 79% agree

加味五潜丸｜一
子大每服五十丸空｜九字心塩｜壺湯
下冬加當量各｜菟蚤半兩
一｜加味五赭九治左尺腎脈虚數精神
短少腰膝無力補腎養覺｜氣血之劑
人参黄芪蜜灸｜送蜜炙白芍炒黄蘗｜
檗酒炒當歸酒洗山藥
各一
両/瓚｜面瑣陽酥炙枸杞子牛｜廿州
者龜板酒浸酥炙虚｜虎脛骨制同
兎絲子酒炒各五錢破故紙炒杜仲酥｜
酒炒去寐｜緣五味各七
銭｜錢五分牛膝酒洗兩｜面熟地黄四
両
右為末煉蜜｜蜜和猪脊髄丸梧桐子大
每服百
丸｜九空心温酒或塩湯下
八｜入味丸｜尤治兩尺脉微弱陰陽俱
虚雙補之劑
熟地黄八
両
澤瀉｜潛鴻牡丹皮白茯苓各二
両
山茱萸蒸去｜朱並核蒸去山藥｜樂面
各四
両｜一
附子一｜炮皮去皮｜一桂心各二｜一
右為末｜木煉蜜｜蜜丸梧桐子大每服
一｜十五十｜一丸温酒下
補天丸治六脉虚微氣血衰弱虚労訶｜
託俱補

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.519 · left leaf

upper register · 79% agree

如疾｜瘥者星｜生當歸生地黃之類加何首烏尤妙如疹难｜難泛者用大補湯如体/弱｜休痛者以恭敬｜悉卽氣加方｜芍藥皮陳芪｜或異功
散其性大热逢｜太熱逢秋冬稍冷可用或春夏而夆｜峯此方誠恐以热攻热发愒｜恨人者多矣若｜君用官桂｜桂乃作辨以藥｜之蓋速宜
荃凉｜奈何之劑鮮之附子大热｜执亦不可用
也若嗽者加桑白皮旋栗｜藥花以瀉｜運肺火嘔者藿｜藍香以扶正氣預當壽｜稍盛毒甚者
牛旁子木通耳｜甘草何首烏亦不可缺
也若堅紀誰｜養鉗者非紫茸｜草木香不能降
也於可｜亦曰肉桂酒浸人｜入參白朮之類若
小便多｜運亥者益智泛不收者夆｜峯四君子
湯如｜加何首烏少使黃芪｜芪二服則易妆｜收
者君｜若未出之先宜服參蘇飲｜麻飲或服升
麻葛根湯若出窈｜務要仔細观｜視其所先
一｜真方全書

lower register · 83% agree

天一以生水之劑
紫河車
一具即胞衣男用女胎女用男胎供｜但
以初胎為佳若不可得即仕｜生盛婦人者亦
可
黃檗｜蘗
酒各/炒｜煥龜板
炙各
三兩
杜仲
酥｜斷
炙
牛膝
酒浸各
二兩
陳皮
一｜二兩
冬加乾姜
五
錢
夏加五味子
一兩｜所
○已上
俱為細末○右以河車水洗淨布絞乾或用酒煨熟入諸藥末共搗勻焙燥再為木酒糊丸梧桐子大每服百丸空心温酒或百沸湯下
班龍丸一｜一歌曰尾閭不禁滄海竭九｜丸轉神丹都
漫說惟有班龍頂上珠能補玉堂関下血○此藥理百病養五臟實精髓一｜壯筋骨益心志安魂
魄令人駐顏輕身延年益壽
鹿角霜鹿角膠兎絲子｜一
酒浸二宿蒸熟/鴉為餅晒乾研/成末梴子仁/去壳取净熟地黃/制法與兎絲子/同已上各十兩/白茯苓去皮補骨脂/炒各/五兩
｜一

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (一 = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.520 · right leaf

upper register · 86% agree

出之疹亦要明白五行然五行惟火
可惡若得水者滋潤之埋｜理或遇金木
土者以全配其五行反為吉兆
○論痘疹藥性法
○升麻解痘｜瘟毒発热｜挽時用之解毒｜每
登痘報痘後热毒亦可用○柴｜兆胡
性寒解肌表执心｜它毒大盛者可用痘｜疽
出後寒者不可用○麻黄痘疹発
热｜执之時吐热慈｜执惡寒可用発散寒邪見
痘之時不可用○于曇｜于腸性寒解肌
表热｜执止渴発热｜执時止热｜吐执口渴者可用
見痘不可用○紫草発热｜执時因伤｜用傷
風寒者可用表裏｜更見痘者不可用○
前胡因傷風哆｜咳嗽痰｜痂涎可用他症
不可形｜妄用○羌｜羌活発热｜执時因｜用盛風
邪遍｜通身肢即｜節痛者可用餘不可用○

lower register · 98% agree

右為網｜絕末先将鹿角膠入磁器内用無灰好
酒慢火煲化却以膠酒煲糊和藥杵二千餘
下為丸梧桐子大每服五十丸空心淡塩湯
或温酒送下
其方切勿加咸
數恐有不效
○實｜寶陰不能受陽圖說
實陰不能受陽謂女人經盡六日之後新血方
盛血海充滿若與交合以實接實多不成胎
又有婦人素面怯｜佉弱雖經後旬日血海未滿亦
復成胎然皆女子亦血勝其精故也
施｜—

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.520 · left leaf

upper register · 86% agree

蟬退退風热鮮｜熱鮮毒發痘若紫紅色
熱｜拱盛者可用寒不可用〇桔｜枯梗
—｜利咽喉寬｜寬胸膈理咳嗽—｜毒氣攻上咽喉
閉者可丁〇凍｜〇陳皮健｜健脾快胃胃節｜潛
化痰不進飲食者可用〇—｜〇厚朴健｜健
胃寬｜寬中若中滿不進飲食者可用〇
—｜〇茯苓補中利水有滲｜滲利之功作泄
者可用水多者不可用〇川芎行
血脉利頭自虛血滯者可用雀怒｜蒼臍大
者尤佳｜佳〇〇白术｜本補中健｜健脾止飲汗
属｜屬虛証者可用热｜熱盛煩燥不可用〇
—｜〇當帰養血行血痘疹血虛不紅潤
者多用〇—｜〇青皮開結氣瘧｜塞痘疹少
用〇—｜〇半夏虛寒疼多嘔吐者可下
加大伏皮消浮腫痘瘡｜癢下氣毒攻
内肥瘦應｜胎腹滿下之尤妙〇—｜〇砂仁腹

lower register · 87% agree

〇—｜實應能入虛陰圖說實陽能入虛陰圖說｜謂男子陽精充實適值女人經
後血海虛静子宫正開與之交合是謂投｜拔虛一
舉｜座而成胎矣〇—｜〇經筆｜盡一日交會者成男二日者
成女三日成男四日成女五日成男六日成女
取奇陽偶陰之義過六日無用矣〇—｜〇大抵前三
日新血未盛精勝其血血開裹｜裏精必成男胎後
三日新血漸長血勝其精精開裹｜裏血多成女胎
交合得夜半後生氣時有子皆男而壽
胎｜—

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.521 · right leaf

upper register · 84% agree

中虛寒作痛能溷｜飽滿不思飲｜飲食者可用
○黃芪密暢｜氏客膝理排膿在裏不貫｜貴膿
氣虛者可用○柯子腸胃｜目虛寒泄
瀉不止者可用○川山甲鮮葍｜毒登
痘最快｜快者○丁香脾胃受寒或吐
或泻｜瀉痘色白者可用○山香癸｜癸痘
消食化痰行氣有此者可下○紅花
血热痰滯｜輿疑濡不行可用○王｜王姜脾
胃虛寒嘔逆不止痘｜症白身凉者可用
○肉桂表証虛｜康寒痘｜短淡白不紅潤
者可用○星｜星角去心火鮮痘毒○
甘草和諸樂｜藥性热｜撓者生用寒者炙
用可可｜一木通快開｜执朔不通者可内｜用○
牛蒡｜甥子利咽喉解風毒热｜撓盛喉痛
虛｜痘紅紫者可内｜用○肉豆蔻内虛胃
塞｜寒泄瀉不止者可用○香附子胃

lower register · 94% agree

○夫婦交合宜旺相日
春甲乙夏丙丁秋□辛冬壬癸
○夫婦交合宜避忌日
晦朔弦望虹蜺地動日月薄蝕
雷電霹靂天地晦冥大風驟雨
太｜大霧大寒去｜大暑日月星辰之下神廟寺觀之中
井竈闇｜閒側之所塚墓戶｜尸柩之傍
此時受胎非止百倍損於父母及生子或盲聾/瘂瘂｜聾瘖瘂頑愚癲狂瘤跛多疾不仁不義
不孝不壽
○論受胎
月｜日月如期知来按時而止則當有娠欵｜欵娠月候
調匀顏色肌膚如｜知常但若沉重煩悶不欲飲｜飲食
又不知患之所在脉又平和是必娠也如此經
兩月後經忽不通則胎結矣

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.521 · left leaf

upper register · 83% agree

中欝｜鬱結不思食可用〇一｜〇大附子表
熏｜裏俱寒痘白身凉｜凉吐痢交作者可用
〇一｜〇滑石利小便解心火之毒热｜热閉
者下姜黄末〇一｜〇連翹解心中風热｜热
五日後不可下〇一｜〇白芷發热｜熱初頭
疼可用餘不用〇防羊｜丰血热｜热盛者
可用餘不可用〇藿｜蕙香胃氣｜衆不寧
嘔吐不止可用〇氷｜水片性热｜热用凉/热｜凉热盛狂燥者可用一二厘以解之〇
一｜〇硃砂热｜熱盛狂言者可用小｜少許以安
之〇一｜〇積从｜令〇澤瘟｜瀉分利陰易｜湯清小
便止泄瀉〇射香患者用之則驚｜醫
痘服之則能發痘〇一｜〇人牙黒嘶｜患寘歸
聳｜寘〇用一｜一二厘以發之〇生｜〇生黄
解心｜一火之毒發狂燥｜懼語痘紫者可要
用〇發｜〇麥牙〇神曲飲食傷胃停滿｜慢瀰

lower register · 78% agree

〇十月胎｜松加形圖說
初月胎形如珠露/詩未入宮羅任昆户/曰猶如秉燭在風中｜一
劉五妹云初月受胎一點精華如草上露珠凝
木有宮羅也在昆户之所鄭｜卿玄莊｜注云陰户七寸
為昆户其胎未入腹内或散或聚如住月信報之
章｜置胎散如本婦廉｜雲氣薄及病後受者湏用此
方他或只是氣不和通用安胎和氣散專調理
懷｜懷胎一月滿足少婦害羞時醫家不識誤作阻
經此胎當有暈噫｜惡心不思飲食六脉浮紫｜漿可進
此藥當歸白芍銘｜各三錢枳壳銘｜鈿砂仁川芎/銘｜用芽各一茸｜錢甘草松｜殼
〇右剉散分作二大服每服水一一｜初月胎形如珠露未入宮羅在昆戶猶如秉燭在風
中風紫之時留不住

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.522 · right leaf

upper register · 85% agree

中焦不化者可下

○痘疹發热｜熱三朝証治門

痘疹發热｜熱有類傷寒形其自然｜行欲增寒/壮热｜定壮熱身体｜體疼痛鼻流清涕者參｜麥蘇欲｜欬

若壮热｜壮熱不退諸語｜謗昏昏迷者用人｜大参君｜痘

活散若泄瀉要分冷热止｜熱七者小便亦｜赤

口渴用補益｜兩本散加木通若干｜干嘔如｜加姜

汁炒黄連渴者加麥門冬冷瀉者小

便清可用理中湯加附子渴者加人

参官桂此方首尾可用

○痘疹根窠痕三朝証治門

痘疹發热｜熱一日而出者凶二日出者

次之三日出者四日五日出者皆輕

若热盛急用人｜入参羌｜羌活散加紫菀蝉｜草蟬

退牛旁子之類須数｜救帖不妨若紫紅

色可與花毒湯加酒炒黄芩｜芩若吐衄

lower register · 83% agree

鍾半煎至七分空心執服渣｜涸再煎服

二月胎形比極中/如花初綻蕞珠紅/分枝未有宫羅内/氣妆陰陽血脉同/二月胎形｜一似花僕｜僅氏云其胎受一月滿足以受

血近陰形似桃花分枝葉在母比極中鄭｜顛玄莊｜注

云比｜北極者陰户八寸也其胎入腹未入衣裹｜裹

安胎和口散凡｜柔九慣墮胎者一月間須两服保

過五箇月則不用也專治胎刖二｜前三箇月多有

人家桃磚換石移床鋪口｜蘆傷觸胎氣不安虚弱

之多有此証頭暈目花噁心嘔吐不思飲｜飲食宜

進此藥藿香陳皮蒼木｜术砂仁黄芩

桔梗益智仁薑｜一二一｜錢陳枳壳三戟廩｜錢厚朴甘草

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.522 · left leaf

upper register · 79% agree

可與犀角地黃湯述｜既盛加黃芩｜癸若夾/疹｜參可以脹｜麻黃于肩｜于爲解之而疹｜參目退治｜一痘若發斑可與麻淋｜茱萸脈干葛浸｜爲湯多磨厚｜蒼犀角木在內仍加紫豆星蝉｜草蟬退水煎｜前若渴照則分冷热七｜熱匕用四苓散冷用犀｜理湯

○痘疹起脹三朝証治門

痘疹起脹三朝肥滿先｜胞涵入澤根窠紅活

飲食如｜加常者不煩服藥若陋｜君陷頂灰白

色者属氣虛可與四君子湯加黃芪｜氏相和當｜堂歸川莒｜菁山查｜查以消參芪｜芪之類

若紅紫色原热｜熱毒未解可用四聖散｜遺

倍加紫草酒炒荃｜荃連紅花之類治之熱者四荃｜苾散冷｜亦者理中湯送下暑鬠/○黃｜葛菟貴膿三朝証治門

貫｜賈膿三朝湏飽滿如菓成热｜是熱是順紅

頂無膿｜膽為逆可用內｜丙托散多加參芪｜民

lower register · 89% agree

紫□｜蘇葉

各｜絡一

分｜—

小茴｜董香

炒｜妙一錢

五分

右用白水煎至七分空心温服

詩｜—

三月胎形似血凝

—｜月胎詩有宮無室味無真

—｜曰娘思食味千般愛

—｜形苦辣酸醎｜鹹並納成

—｜三月胎形似蚕蜦僅氏云其月胎形漸漸長如

蚕一頭大一頭小形漸漸欲圓未入宮羅劉五

妹云已至臍下漸漸有畏｜裹其形薄薄胞之此三

月胎形與二月俱同証○一問虛弱胎氣不和

嗯｜噁心嘔吐或觸動胎氣蕪｜兼秋天氣寒極热相热

所染照前次弟加減用之○有瘴｜癘疾加青皮早

菓□｜各二錢

不可用常山○有咳嗽加杏仁五味子各一

錢

○有潮熱｜热不退加黃芩柴胡各三

錢

○有氣

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.523 · right leaf

upper register · 67% agree

桂虆｜梓之内虚泄瀉｜盧世樞加豆｜豈寇可與翼｜異功
散治之
○收厭｜文歷三月正台印牧廠三朝証治門
痘疹瘡十日至十一日當厭風精衆｜面瘡塌突
戦咬牙泄瀉腹脹者急用翼功散治
之如飲食不進水谷不化急與丁香
陳皮肉豆｜豈寇附子之類後｜必當鮮｜一解毒若
无｜死膿声｜聲啞氣急者不治
豆｜一上痘疹｜直診証治｜右諄諄明白要在随｜隨証
虆｜震方對证用強｜正明照無有｜一不驗但観｜觀眼力
識
一/也｜出處謹以方具手｜予左
去麻黄加｜工之內若根窠紅花歸身連喬同前服小｜潤頂突
堅硬緊張者｜體不必下藥若紅紫色口
渴壯热詁｜濁壯熱話語者此属实熱｜恐宜用一方一｜去麻黄加紅花歸身連喬同前服小

lower register · 64% agree

四｜喘急者加沉香五分另磨和藥服之此月入宮羅之室崔氏云衣裹漸至丹田之所食忌兎
獐毒物祿高有涎之菜鄭仲靈云諸毒物食之傷名食之傷氣不和是也四月胎形分四肢
詩｜一入宮胎隱｜隱始成兒
曰｜一食忌兎獐并｜偉井毒物
免教胎内受邪氣
衣裹｜裹漸至丹田之所
食忌兎獐毒物蒜菹有涎之菜蘞｜米齒仲濃｜靈云諸毒
物食之傷胎名食之傷氣不和是也｜一
活胎和｜杜氣散專治胎前四五箇月身體困倦
氣急發熱｜執飲食無味貪睡頭暈四肢痠軟冂｜冝進
此藥蘇葉紅甘｜北草紈小苗｜面香一子｜壬半枳壳四子｜矛半
厚朴香附駱｜銘三砂仁蒼术陳皮去皵｜白各二系
右剉散分作三服每服用水一鍾半煎至七
分空｜完心温服

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (一 = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.523 · left leaf

upper register · 88% agree

便赤位 | 泣加木通灯心使小便通利則 | 则
心火热毒得以下泄矣失此不治五
六日 | 日後变色而死
觧 | 解毒方防丰苡蓉 | 惹活川芎
白芷蝉退麻黄紫草
柴 | 些胡右剉 | 到散妄忽煎 | 前服汗觧去
热 | 熱毒則豆出决然輕而易愈矣
一報痘三日之内身凉口不渴痘色
淡白 | 日口氽 | 气冷小便清利者此属虚寒
宜用後温補送出亦易收麽 | 靨矣失此
不治十日后必疼 | 痒塌而死
内助方陳皮厚朴人参
川帰白芷肉桂茯苓
半夏青皮 | 一右剉散生姜水煎
者先苓 | 茶澤瀉〇泄瀉不止者
桂子 | 一肉豆冠 | 寇煎服

lower register · 73% agree

五月/胎 | 日
詩
五月男女分定胎/前人說與後人知/五更在娘臍邊轉/男左女右定無疑 | 一
此月胎形男女分定# | 周寄云令胎量 | 母前行使人
後喚乏 | 之左回頭是男右回頭是女男思酸味女
思淡味入宫室之内其胎安穩
一 | 五月男女分定時前人說與後人知五更在娘臍邊轉男左女右定無疑令胎母前行使人是女男
思酸味女父穩瘦胎飲 | 飲專治胎前五六箇月胎妊 | 姙困弱令胎
母腹重貪睡飲 | 飲食不知味肚中膨脹有此歡 | 動此
藥可進二三服養聚胎氣精神
當歸 | 歸二一 | 錢白芍藥益母草 | 早枳壳各四
錢砂仁
香附子益智仁各三一 | 錢甘草錢伏苓 | 苓五錢小茴 | 歯香
二羊 | 錢半〇右用白水一鍾半煎至七分空心
温服

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.524 · right leaf

upper register · 88% agree

報痘｜短三日之後頂陷｜陷不圓｜圓突宜用
前刀｜力可服数｜數帖健脾胃助氣血瘡｜庶得
貫膿収尒｜收靨矣此不治八九月｜日後必成
虛窠発痒｜癸癃而死矣
一報痘三朝之内痘不起発｜發著宜用
托出否則毒气攻内変成脹滿而死
宜用後方
發｜癸痘方川山甲
用荆蔴｜稍炒
焦黄色
射香砂/右｜訛在研極細末六七歲者热｜熱酒送下
三分不可过多被盖片時遍身江
出紅腫而起矣
一報痘之時口渴話語精神徃乱煩
燥者此由心火燥於内以致神不守
舍狂感識｜惑讖語如見児｜鬼状外証必紅紫
焦燥壮实不能所謂純陽无陰之候
苟｜也苟非趨援｜投之剂安顯｜顕起死回生之

lower register · 78% agree

六月胎形生髮毛詩/六月｜—胎形生髮｜髮毛長也崔氏云男魂降動其
左女魂降動於右故在母臍中漸漸浮動如通｜也
食水一般
瘦｜六月胎飲｜形生髮毛却在臍中漸漸高飲食不同二三月主娘愁悶又心嘈崔氏云
男魂降動其臍中漸漸浮動也通嫂胎飲調治六箇月胎婦此乃多有瘦弱之
婦可服瘦胎飲一服護其胎母之苦臨產之時
令其脉自然調和易養易生更無憂慮之危
當婦白｜歸自芍藥益母｜丹草枳殼益智仁
砂仁香附子小煎｜茴香茯苓甘草
右用白水煎空心温服〇又有健壯｜壯之婦兒｜免
服其蒸｜藥胎孕安穩｜穩臨產之時自然清爽

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.524 · left leaf

upper register · 88% agree

功哉

唐｜庸医薬用尋常湯餌｜何徒増｜増悶乱｜亂耳猶

澆一盃之水以救一車新之心其弗

克明矣予製驗方後所宜急服此薬

退火回生丹活石一銭｜鐵硃砂一銭

水｜冰片三厘右為細末冷水調服

睡少時神安轉紅活

一貫膿三朝之内痘陥頂者益気｜陥頂者益気｜蒼血

虚也不早治則痘成虚窠十二｜一日後

遍身擦破毒気攻内腹脹悶乱声/噎｜亂聲啞氣急而死宜服内補散

内補散人参川帰桂皮

甘草川芎白茯苓黄銭｜鼠

防丰厚朴桔梗白朮

陳皮右水煎温服数｜數帖令脾｜脾胃一｜健氣血旺扳壓

lower register · 78% agree

七月胎形漸見成｜一

七精者眼有光鼻有氣耳有開口知味各道俱

全言博｜七精者眼有光鼻有氣耳有開口知味各道俱全傳難經云七月已定亦

有降生者成人所

以胎母行歩艱難也

詩/七月三二百有餘日/若有胎生亦成人｜一

知母補胎訣｜欵調理胎前｜則七八箇月胎動如石

行歩艱難脾口｜脾胃虚弱時有氣｜寒急衝心胸前脹涵｜潤

咳嗽發｜誤食熱毒所以胎氣不安名曰子懸証

知母蘇葉各二一｜銭枳殼四銭益母草黄芩

滑｜消石甘草｜旱香附各三

一｜銭右用白水一鍾煎｜前至七分空心温服渣耳煎/二｜顆一次服

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.525 · right leaf

upper register · 92% agree

百/万/寸/寸全李青/冒 | 一貫膿三日之内身冷且 | 互灰白色或
不進飲食寒空 | 氣逆上或嘔吐或腹脹
痛或泄凊 | 一清水手足厥冷者所謂純陰
无陽之証急服回生起死丹
回生起死丹丁香九粒干姜二 | 一錢
右咬咀水煎 | 前服絮綫 | 彼盖片時令脾
胃温煖陰退陽回則痘変紅活也
〇補遺方
陳 | 瞭痘大靈丹此藥服於痘之前
硃砂安息香全蝎各三分
牛黄水 | 米片各半分玳瑁三 | 二分
犀角馬 | 瑪瑙紅花各二錢半
川歸五分乳香金銀箔各一帖
右為細末用蟾 | 蟠酥為丸如皂角子
大每人服一丸薄荷湯下
稀痘 | 瘴小靈丹此藥服之於未出之

lower register · 71% agree

八月胎形定見真/孩児腹内有精神/娘眠思食呑難下/困弱寡愁躭悶行 | 一
此月主心悶煩燥思食不止
劉五味 | 休云食差 | 羞飯
如食糠皮令母困弱胎氣傷脾胃一 | 胃不和也
一 | 八月胎形定見真孩兒腹内有精神娘低思食呑難下困弱憂愁躭悶行劉五侏云食
羞飯陽暉胄不和一 | 也梨氣平皆散專治 | 冶婦人胎前八九箇月胎児 | 兒
長髪 | 髪以致胎母脾胃虚弱而不調和温熱相攻
五臟六腑不和或變痢疾雜患之病此藥安胎
和氣也
厚朴 | 利黄連 | 運猪苓澤瀉 | 鴻地榆黍 | 各五
一 | 錢蒼术三錢升麻一钱 | 錢半白芍三錢豆寇一钱 | 蔻半錢陳皮四錢
柴胡二钱 | 錢半甘草盛 | 一
右用白水一鍾平 | 半煎至七分空心温服

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.525 · left leaf

upper register · 87% agree

離戒之杵已出之後/株｜硃砂七分水｜冰片七厘雄黃一錢｜—五分
射香一分半右細末可医三個人
灯｜災心湯下五丸則痘｜瘡出稀少取瞻｜蟾
酥丸如梧桐子大每服大葱｜入慈内少
服过取出葱｜慈不用
不｜—收功方象牙不拘多少取銅銚
内炒黃紅為度
右研細為末每服七八分或服一
錢或服二錢二三分亦可用白水
解毒｜調下脈貫散治痘｜瘟先發腫若見先腫者
逆此為痘母十發｜癸九死難治
忍冬花半斤甘草一两木通
防手荆芥枝子各三錢｜钱
右剉散水一鍾酒一鍾煎｜前服

lower register · 83% agree

到此月数即主胎娠在左右脇大動胎母覺知｜—
憂悶煩積飲食不快矣
—｜九月胎瘦重如山母胎欲産得齊全一夜一升三合血曾見古人不虛言脇大動胎母覺知保生如聖散專治九月胎娠欲産期候忽然
肚腹疼痛意欲生産嬰兒不降為因胎前悞｜悞食
熱毒之物傷胎不順或先行其水嬰兒不降宜
服此薬
益母草二兩｜两當歸四錢弱｜—
者多用
大枳壳一兩｜两砂仁二錢｜钱
陳艾｜芠一茸｜钱甘草六分益智仁二｜—三錢｜—去皮白芍四錠｜錢
右剉散用白水二碗煎至一碗半不拘時候
温服

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.526 · right leaf

upper register · 84% agree

肉托｜託散治痘瘡毒恨在裏｜生裏頂陷｜陷灰
白色不起發根巢｜策不紅
人參川當帰肉桂坦｜甘草
川芎黃荃｜蘇厚朴防壬｜圭
白芷桔梗芍藥木香
若泄瀉加柯子肉豆蔻｜耳寇有班者加
紫草酒炒黃連酒炒黃芩牛蒡子
右咬咀水煎服｜前服
化毒湯治痘瘡紫紅色不起發者
紫薛｜草升麻陳皮坦｜甘草
右咬咀水煎｜前服如君｜知若不起發有｜者加
酒炒連荃｜芩大便閉者加米同煎
消毒散治壓—｜留後痘風瘡毒
荆｜荊芥二錢防主｜圭牛芳｜蒡子各一王｜二半
右咬咀水煎｜前服忌魚腥
韶｜酩粉散痘瘡痛劍｜新愈毒氣未散瘡君｜—

lower register · 76% agree

此月胎形滿足四肢開骨鎛縫｜錚絲俱開方許降生/劉五妹云方絶｜絲
降生莫令落在地恐其賊風衝/吹嬰兒霍氏云｜貯初生兒子摟｜棲抱輔
抱畏｜裹仔細蓮/慎方可｜謹
下聖散治婦人氣血兩脛懷｜虛慄娠無所榮｜榮養
—｜故四肢無力瘦削人倦飲食少思或平昔素有惡｜圓
胎此藥｜率性平｜乎滋血養氣必先月月服数｜數貼則無
患亦宜避忌惱怒壞｜曖生冷酒｜潤醋熱物切宜慎｜慳之
人參白朮熟地黃砂仁—｜救黃耆｜—各五
甘草川穹川芎白芍｜—

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.526 · left leaf

upper register · 85% agree

惟煎 | 前其癩 | 癩猶黒色或門門攻起用此
紫塗 | 塗之神效韶粉二 | 一兩輕粉一銳 | 錢
右為細末猪油拌和如羔塗瘡上
吹 | 次耳卅治口 | 痙疹眼生膠 | 臆膜輕粉
黄册 | 卅各等分右為細末吹入耳中左
患吹左即退
治 | 一桃紅痘疔方雄黄一 | 一錢紫草衫 | 和
右為細末胭脂汁調銀替 | 簪桃破黒
疔将薬入内極妙
治暄 | 痘脹痛不可忍方白为 | 自芍薬一銮 | 錢
為末湯調下
治 | 一咽喉痘疹不進食方生 | 生旁子二 | 和
桔梗五分粉草節乾痰 | 蛇疼多加瓜蔞 | 蔓
仁銕 | 一錢
○前後不治死証
凡未出声哑喉 | 嘆喉者不治補註
專發 | 一

lower register

續断秘○右用白水煎温服
○占男女歌訣
口成是雙单是单乾坤爻位两頭安中間正位
玄機事產女生男在此間○觧曰上爻為父下
爻為母中間正位為下種之月假如父母年俱
是单若单月下種是得乾卦為男父母年俱是
雙若雙月下種是得坤卦為女餘皆倣此下種
之月以得節為准如正月内得二月節作二月
筭若節氣交度之際慎不可交接下種犯之恐
成半陰半陽受胎夭折也慎之慎之
陽易曰陽乾為父震為長男
卦卦多陰鵞申男艮為少男
陰陰卦多坤為母巽為長玄
卦陽是也離為申女兌為少女

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.527 · right leaf


upper register · 83% agree

官作 | 已
出五日内見者亦不治○— | ○未壯遍
身扒被 | 抿破無氣者不治○— | ○舊有瘡瘍口/瘻 | 疮痍故塵不愈者不治○— | ○痰涎壅盛氣急者
不治○— | ○未出神昏氣促者不治○— | ○腹
痛泄嚅瞶皿 | 瀉膿血者不治○— | ○一出全 | 空無起
惡密 | 密如蚕種平片花搭者不治○— | ○肌
肉黎黑如披杖者不治○— | ○漿水米粒
不入口者不治○— | ○一出暗癇 | 癰焦黑若 | 訪
不治○— | ○眼肉黑珠起浮油混睛者不
治○— | ○收斂胥前 | 壓圓后内有紅紫泡者不治
○— | ○泄瀉藥食不停不化直下者及肛
門如竹筒者不治○— | ○目中神丸 | 光不明
珠色轉緑轉赤者不治○痘 | ○啞后傷風
傷食肌肉脫瘦 | 悗瘦者不治除此之外
縱有雜証及痘雖 | 疝錐稠密畧有潤澤 | 澤起
與湏仗鼇真 | 吳湏伏藝是精眼力精到胸中誠耀 | 雄

lower register · 84% agree

○筭男女歌訣 | —
七况 | 十二四十九問娘何月有除却母生年耳潘 | 嬉一
十九是男逐單 | 埵单位是女必成雙 | 雙是男若是女三
五入黄泉○— | ○假如一婦人年二十八歲三月受/娠 | 分娘筭是男喜法曰先下四十 | 寸九子
在位然 | 母後加
上三月受娠 | 娘三退七 | 最比共數五十二内除去母生
年二十八歲止乘得二十四再加上一十九天 | 共
是四千 | 十三是单故生男喜○— | ○又如婦人年二十
一歲七月歿胎如前法加除却是五十四数是
雙 | 雙則生女喜○— | ○右法甚 | 其驗但要受胎月分明白 | 自
及母年歲的真 | 直最准若筭得是男而生女是女
而生男者其子不過三五歲而入黄泉 | 八賈家也
婦人有子其 | 直事有三 | —年命相親 | 别墳墓不嗣
右二 | 一者非樂可殀君去病 | 樂命歿若之歿婦疾 | 歿用樂 | 墓方有效

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.527 · left leaf

upper register · 91% agree

所見一定患家勿惑謠 | 誰言彼此皆二 | 一
誠心用意調護必可保全天和長有
夫命
第一看口唇舌尖紅活無燥白之色
乃吉証〇一 | 〇第二看痘圓 | 折圓活紅潤地
白分明雖多亦吉〇一 | 〇第三看心窩額
上稀少乃是吉証〇第四看無巢 | 黑陷#
頂黃 | 黃内暗如蒼臘色外黃潤如油色
乃是吉証〇一 | 〇第五看出未 | 来痘頂不焦
不紫吉
〇經驗死証目数 | 數不治歌
初出頂陷 | 陷連内紅〇過至九日一塲
空〇又如血點帶紅紫系 | 一〇班証死在
六日中發班黒者在朝夕〇班青浪 | 浪
刻去匆匆〇無膿痒塌期三 | 一日〇不
治腰疼及挺胸一 | 服痕像 | 似沸如頗/閑 | 鴉閃〇

lower register · 90% agree

勞傷血氣月候不調將理失宜飲食不節
乘風取冷冷氣怯虚結於子臟決難有孕
自少有疾多服熱藥天癸早耗終身無子
女人血虚子臟冷滯以不生育丈夫劳 | 勞傷
風震目暗精氣不濃精清如水精冷如氷
不能施化〇已上皆當服藥
續嗣降生卅 | 丹治婦人亶 | 重氣受弱胎臟虚損子/宮冷
| 擯宫冷憊血寒痼犯 | 冷難成子息功効如神
當歸
去芦酒
洗焙乾
桂心
去皮不
見火
龍齒
眞
的
烏藥
真大
云著/盜督 | 心者藍筍子
去枝
梗
杜仲
酒炒过
去系
石菖 | 鳥蒲
燉 | 煩去
毛
豆 | 吳茱
更
去枝
梗
茯神
去木已 | 已上
各一兩
川牛膝
去芦酒
浸焙乾
秦艽
去
芦
細辛
洗去
土
桔梗
去
芦
半夏
湯泡
七次
防風
去
芦
白芍
藥銘 | 各三
錄 | 錢
乾姜
二 | 一兩用半
生半炒
川椒
二兩去子
合口者
附子
用一隻重入 | 八錢脐 | 膈心作竅 | 窠如皂子大
入朱砂一錢混帶 | 濕鼈包裹 | 衆以火煖过 | 煨過
牡蠣
用
大 | 一

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.528 · right leaf


upper register · 81% agree

—｜直字全書舌捲囊實便不｜宿哭留○紫泡刺出黑血
者○飲｜飲食瘓｜猴候証俱凶｜凶难瘀面｜療面腫痘
不腫○青色黑疿｜陷及無膿○二便流
利下腸垢｜喫○更有吐瀉出蛔虫頭温
足冷好飲水○痘结｜先驚癘｜—後强难｜藥難攻○
氣促泄瀉渴不止○目無視｜魂若命不
供声｜堪虧啞尖｜失音叫與｜叫跑哭○痘色紙｜縱好也
难｜難終○有種氣急亦难｜難治○如灌｜準膿
好是傷風見此宜服參蘇飲○餘証
叅詳須用功
○秘傳經驗麻疹治訣｜—
按麻疹出自六腑先動陽分而後歸
於陰經故標属｜屬陰而本属｜屬陽其発热｜發熱
必大與血分煎熬故血多虚極｜耗目尾
當澈｜滋陰養血爲主不可一毫動氣鼻｜當
從緩治所以人參白朮半夏煩竇｜燥湯之

lower register · 93% agree

片要漳泉二州的用塗｜童便浸过塗了却用帶｜昏
包覆｜裹用米醋浸令而｜昏湿盖｜盐泥固脐候乾用炭
五斤煆過｜过遇合藥時秤
三兩用餘者口｜留下再用
右為細末取附子内硃砂研為細末留下為
衣以糯米糊為丸如梧桐子大每服三十丸
漸加至七十丸｜九空心淡醋湯呑下或温酒塩
湯皆可下每日進二服此藥及治男子精寒
不固陽事衰弱白濁夢泄及治婦人血虛｜虛帶
下肌瘦寒熱｜熟但是男女諸虛百損客熱盜汗
氣短力之面｜乏而無顏色飲食少味並皆治之
治婦｜活如人無子力｜方於五六月採益母草連根透
風陰乾不犯銅鉄石臼搗細末煉蜜為丸如
弹子大温酒下一丸服至十月央有効胎前
産後諸病皆可服之
加味養荣丸｜味此丸｜九女人服之有孕且無小産

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.528 · left leaf

upper register · 90% agree

剂 | 利片麻升動陽氣上冲皆不可用也
又必内多實热故四物湯加芩連 | 芩連防
風連喬以凉其中而退其陽也
一發熱之初增 | 增寒壯热鼻流清涕 | 濡
濕身
脉 | 躰疼痛嘔吐泄瀉証候未明是否便
服蘇葛湯去砂仁陳皮腹痛亦 | 一用華
盖表之得汗自頭至足方散漸藏衣
披則皮膚通暢腠理開 | 閒豁而暢 | 療易
出
矣縱不出亦不可再汗恐致亡陽之
疾 | 疫只宜常與葱 | 忽白湯飲之其脉自
| 時省出
矣服此自無發搐之証
一發熱 | 热之時既表之後切戒風寒冷
水瓜桃生果之類 | 類如一犯之則皮毛
閉塞毒氣難泄遂变 | 变紫羔 | 黑而死矣
如
極渴欲水只宜少與葱 | 蔥白湯以滋其
渴耳必須 | 湏使毛竅中當 | 常徹汗繩纏
| 澗澤可

lower register · 94% agree

之患當歸
酒浸白朮 | 木熟地黄
酒浸各
二兩
芍薬
川芎 | 等黄芩炒香附
各一兩
五錢人參茯苓
具母陳皮
大
白麥門冬
去心各
一兩
阿膠一 | 七錢甘草
炙五
錢
黑豆
大者炒去皮
兩十九粒
右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服匕 | 七
八十
丸食前空心塩湯温酒任下忌食諸血
壬子丸 | 九此丸服之不過半月一月有孕
試之
屢 | 屢驗口茱萸 | 昃棻更白芨 | 及白臉
白茯苓
各一
兩
牛膝
五
錢細辛一 | 五分五 | 一菖蒲白附子當歸
各少
許
厚朴桂心沒藥人參酪 | 各四兩乳香三
右為細末煉蜜丸用壬子日修合如紅子大
每服十丸有効若男子服補益若孕婦服之
即生雙胎空心好酒送下無夫婦者不可服
轉女為男法受姙之後用弓弦一條縫 | 縫
囊盛

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.529 · right leaf


upper register · 92% agree

也又忌楊梅李魚酒蜂蜜香｜煮對之類
恐｜惡惹疳亟｜臣上行
一麻疹既出之時如色紅紫乾燥暗
晦乃火盛毒熾急用六一｜一散解｜既之或
四物湯去地黃加紅花炒黃全｜荂進之
一麻疹既出已過三日不能沒者乃
內有虛热｜熱宜用四物湯進之加失血
之証加犀角汁解之
一麻疹則後有燒热不退飲食不進
井｜非証並属血热只宜四物湯按証照
常法加減渴加麥門冬犀角汁嗽加
瓜蒌｜麥仁有痰加其母去曰｜白陳皮切忌
人參白朮｜木半夏之類不可慎｜惇川
一麻疹泄瀉涎分新久寒熱新瀉热/渴｜熱瀉者宜用四荂｜令散加水｜木通服寒瀉者
十中無一如有傷食傷冷不得已｜已以

lower register · 83% agree

帶婦人左臂近肩垂繫腰下口｜滿百日去之〇雄
黃一兩絳囊盛帶左邊斧斤｜一一把置產婦床頭仍
置刃及床下勿令人知〇鷄抱卵時置斧窠下皆
雄鷄也〇已上數｜數法用其一可矣
催生神應歌｜數車前子一兩｜而冬葵｜癸子二錢白芷｜正三錢
枳壳二錢〇右｜枝浣鬚左用白水煎不拘時｜屮服
如十月足者無痛陣亦可服連日未產者則加
牛膝二錢痛而急堕｜墮則入大腹皮似｜釵欲產不產而
無痛墮｜陣者血虛則加白芍川芎川歸尾紅花蟲｜鰹
又方二｜一單用黃葵子搗爛用紅酒調服即產
催生則｜川療產生理不順產育艱難或橫｜橫或逆
大有｜行神効｜效宜大｜天醫宜分｜目食十二川尾｜万足腦去腹研
如泥｜一
通明乳香一錢研細母｜每丁香為一｜二錢大｜入末射香一兩｜芥研細｜字
右以乳射下杳样｜丁香柈勾入兎腦｜死腦髓和九鷄頭大

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.529 · left leaf

upper register · 78% agree

理｜壇中湯一服而止乆瀉｜濡者只宜豆蔻/丸｜正之尤或五倍子膏｜鴛粟器燒｜殼塊灰調下瀝｜澁之

一｜—麻退｜根之後沅｜用避風寒飛水温如或

不｜木謹遂終身咳哆｜嗽患瘡無自愈曰

一淋疹痊｜麻根除後大忌猪｜循肉魚酒鷄子之類恐着終｜若絲身之咳只宜用老鷄精火

肉煑｜焚食少助｜助滋味可也

一白婦官｜孕嬋以四物湯倍加白朮條今/艾｜芩文葉安胎｜贈清热爲主則胎决無厄｜危而

麻决易沒｜没矣如胎｜將氣冲｜上冲急用学｜半根

艾｜文葉煎湯禁｜焚生極樹｜柘榔服四物湯大進

一麻疹正出之開雖｜腸雖不進飲食者但

得麻色淡紅潤｜潤澤真正不爲害也盖

热青未｜熱溝米鮮内蘊｜蘊實热｜熱自不必食也退

後若不食當棄｜—用四物湯加神麥砂

仁二｜一貼决能食矣如胃氣弱者忌

lower register · 81% agree

陰乾油紙｜沾絕密封同臨産服一丸温水送下立

産｜症男左女右手中握藥出神驗

催生不傳遇｜過仙九｜力治婦人坐草艱難

草｜單麻子封齒四折硃｜去門珠砂雄黄各—｜錢半蛇蛻一尺

—｜被右為細末粥糊丸弹｜彈子大臨産時先用川椒

湯淋洗臍下納藥一丸臍中仍以鵬｜膺紙数｜數重

覆藥｜復漿上軟帛拴｜捨繫産則急取去藥用｜汁一充三凡｜炤

如聖膏｜澶治難産用草麻子七粒去殼｜穀研細

成膏塗腳｜脈心立産急洗去藥遂｜逐則腸出却｜如以

此膏塗頂上腸自縮入去一方草｜尊麻子頂｜百粒

雄黄末一錄｜錢同研用如前法

治｜—破水不下若破水三五日不下将死者

用魚鰥鯽魚｜鱉大者三寸香油浸過燈上煙之/滴｜—下油｜燒商下由入酒｜酉内灰為｜夾魚末調酒｜燭酉服之立｜上下

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.530 · right leaf

upper register · 88% agree

一麻｜琳疹既出是一日而又没者乃爲
風寒所冲麻毒内攻若不治洋爛｜痒爛而
妃｜死可用消毒散一帖挽｜热服遂安如麻
見三日退後若有破｜彼風之証亦用消
毒飲神妙
補註愚｜俎慮驗麻｜痲疹始出類傷風寒頭
疼咳嗽热｜熱盛目赤頰紅一二日内
郎出者輕必湏觧表忌見風寒背
腥厚麻｜厚痲如犯｜犯之恐生痰嗽变｜变成驚
搐不可治矣初起吐瀉交作者順
乾霍亂者旋｜逆欲出不出危亡立至
新｜掛板增｜增補天下便用萬

lower register · 25% agree: models read this very differently

HunyuanOCR

治逆生方湏臾不救母子俱亡用蛇壳
蟅壳十酒
齒髮損品燒爲只分二服酒調併
進二服仰卧片時或用綉針於小見脚心刺三
七刺用塩少許濃之處即時順生母子俱活
治子死腹中瓜蒌朴硝共為末酒調服即下
治胎衣不下用半夏白欽各一兩為末酒服
錢雞產眼横生服倒生脫兒死頭
禍神効
打胎方用采片號附香家樟腦錢共為末密
為丸絹包父陰户即落
絶胎方用血管鷙毛燒成百草霜鎔一共為
末酒調下行經後服之永不受胎

PaddleOCR-VL

絕胎方
用血管鵝毛燒灰百草霜
共為
末酒調下行經後服之永不受胎
寶全書卷之十七終

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.